

**VACUNAS INFANTILES EN USO DURANTE 2012**

INMUNÓGENO	EDAD ADMINISTRACIÓN	VÍA DE ADMINISTRACIÓN *	NOMBRE COMERCIAL	MANIPULACIÓN
Hepatitis B (infantil)	0 meses	Intramuscular	HB VAX PRO 5 mcg.®	Jeringa precargada
VPI+DTPa+Hib+HB (Hexavalente)	2 y 6 meses	Intramuscular	INFANRIX-HEXA®	Jeringa y vial: <b>hay que disolver</b>
VPI+DTPa+Hib (Pentavalente)	4 y 18 meses	Intramuscular	PENTAVAC®	Jeringa y vial: <b>hay que disolver</b>
Triple vírica	12-15 meses y 6 años	<b>Subcutánea</b>	M-M-RVAXPRO®	Jeringa y vial: <b>hay que disolver</b>
dTpa	6 años	Intramuscular	TRIAxis®	Vial
dT adulto	14 años	Intramuscular	DIFTAVAX®	Jeringa precargada
Meningococo C	2, 4 y 15 meses	Intramuscular	MENJUGATE®	Jeringa y vial: <b>hay que disolver</b>
Varicela**	11 años	<b>Subcutánea</b>	VARIVAX®	Jeringa y vial: <b>hay que disolver</b>
Virus Papiloma Humano (VPH)***	Chicas 14 años	Intramuscular <b>3 dosis***</b>	GARDASIL®	Jeringa precargada

\* El lugar de administración de las vacunas será siempre la **cara anterolateral del muslo** (niños pequeños) o el **deltoides** (niños mayores).

\*\* **Varicela**: solo para aquellos niños que no hayan padecido la enfermedad ni hayan sido vacunados frente a varicela. **Dos dosis, intervalo mínimo de 4 semanas.**

\*\*\* **Virus Papiloma Humano**: Se inició la vacunación en **noviembre de 2008** para niñas de 14 años (**nacidas a lo largo de 1994**); las nacidas en **1998** comienzan a vacunarse según vayan cumpliendo los **14 años de edad. Pauta de Gardasil: 0-2-6.**

**Nota: La primera dosis de Triple Vírica se adelanta a los 12 meses** -Circular de la D.G. Salud Pública de 11/10/2011-. **No repetir a los 15 meses.**

